

# Patientguide

## **LIBTAYO**<sup>®</sup> ▼ (cemiplimab)

### **Viktig säkerhetsinformation för att minimera komplikationerna av immunrelaterade biverkningar**

Denna Patientguide är till för att hjälpa dig att känna igen och rapportera symtom på biverkningar som hör ihop med din behandling med LIBTAYO<sup>®</sup> (cemiplimab).

Detaljerad information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets websida: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). För ytterligare information, läs bipacksedeln på [www.fass.se](http://www.fass.se) eller kontakta Sanofis avdelning för medicinsk information 08-6345000 eller [infoavd@sanofi.com](mailto:infoavd@sanofi.com)

#### **Viktig information**

- Berätta för din läkare om alla dina sjukdomstillstånd och alla läkemedel som du använder innan du tar LIBTAYO.
- LIBTAYO kan orsaka allvarliga biverkningar som kan förvärras.
- Rapportera alla symtom på biverkningar till din läkare, även om de inte finns nämnda i denna Patientguide.
- Vänta inte med att rapportera symtom på biverkningar till din läkare, även om du är bortrest.
- Försök inte behandla dessa symtom själv utan att först konsultera din läkare.
- Ha alltid med dig Patientvarningskortet under behandlingstiden.
- Visa detta Patientvarningskort för all Hälso- och sjukvårdspersonal du besöker, utöver läkaren som förskrev LIBTAYO åt dig.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

## Uppsök sjukvård omedelbart om du får något av följande symtom, eller om de förvärras:

### Hudproblem

- Utslag eller klåda
- Blåsbildning på huden
- Munsår eller sår i andra slemhinnor

### Problem med lungorna (lunginflammation)

- Ny eller förvärrad hosta
- Andningssvårigheter
- Bröstmärta

### Tarmproblem (kolit)

- Frekvent diarré ofta blod- eller slemblandad
- Fler tarmtömningar/avföringar än vanligt
- Svart eller tjärliknande avföring
- Kraftig magsmärta eller ömmande mage

### Leverproblem (hepatit)

- Gulfärgning av hud eller ögonvitor
- Kraftigt illamående eller kräkningar
- Smärta på höger sida av magen (i buken)
- Sömnighet
- Mörkfärgad urin (tefärgad)
- Blödning eller lättare att få blåmärken än vanligt
- Mindre aptit än vanligt

### Problem i hormonproducerande körtlar

- Huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk
- Snabba hjärtslag
- Ökad svettning
- Frusenhet
- Kraftig trötthet
- Yrsel eller svimning
- Viktökning eller viktnedgång
- Ökad hunger eller törst
- Håravfall
- Förstoppning
- Mörkare röst
- Mycket lågt blodtryck
- Behov att kissa oftare
- Illamående eller kräkningar
- Magsmärta (buksmärta)
- Ändrad sinnesstämning eller beteende (såsom minskad sexuell lust, vara irriterad eller glömsk).

### Diabetes typ 1

- Ökad hunger eller törst
- Behov att kissa oftare
- Viktnedgång
- Trötthetskänsla

## **Problem med njurarna (njurinflammation och njursvikt)**

- Behov att kissa mer sällan
- Blodblandad urin
- Svullna fötter eller underben
- Minskad aptit

## **Reaktioner i samband med infusion (kan vara allvarliga eller livshotande)**

- Frossa
- Skakningar eller feber
- Klåda eller utslag
- Rodnat eller svullet ansikte
- Andningssvårigheter eller väsende andning
- Yrsel eller svimningskänsla
- Smärta i rygg eller nacke

## **Problem i andra delar av kroppen**

- Huvudvärk eller nackstelhet
- Feber
- Trötthetskänsla eller svaghet
- Förvirring
- Problem med minnet eller sömnighet
- Ryckningar (krampanfall)
- Se och höra saker som inte är verkliga (hallucinationer)
- Synförändring
- Ögonsmärta eller röda ögon
- Kraftig muskelsvaghet
- Ändrade hjärtslag såsom snabba hjärtslag eller känsla av att hjärtat hoppar över ett hjärtslag eller en dunkande känsla.
- Blåmärken på huden eller blödning

## Viktig kontaktinformation

Läkarens namn \_\_\_\_\_

Läkarens telefonnummer \_\_\_\_\_

Mitt namn \_\_\_\_\_

Mitt telefonnummer \_\_\_\_\_

Min kontakt vid nödsituationer \_\_\_\_\_

Telefonnummer till min kontakt vid nödsituationer \_\_\_\_\_

SANOFI GENZYME  | **REGENERON**

SANOFI | Box 30052 | 104 25 Stockholm | [www.sanofi.se](http://www.sanofi.se)

© 2019 Sanofi AB and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. SASE.LIB.19.05.0205a\_AUG2019.  
Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forskning- och utvecklingsprogram samt med marknadsföring av Libtayo® (cemiplimab).

Version 1.0. Juli 2019. Granskat av Läkemedelsverket 2019-07-15